

Patienteninformation Koloskopie – Version 2 (Termin 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr)

Am Vortag der Untersuchung:

Essen ist den ganzen Tag über erlaubt, jedoch keine Ballaststoffe (Müsli o. ä.), keine konzentrierten Fruchtsäfte.

Am Untersuchungstag:

Um 7 Uhr 1 Liter Moviprep (1 Beutel in einem Liter Wasser auflösen) und zügig (innerhalb von 30 Minuten) trinken. 3 Stunden vor dem vereinbarten Termin 1 Liter Moviprep (1 Beutel) zügig (innerhalb 30 Minuten) trinken. Weitere Flüssigkeitseinnahme (Wasser, Tee) möglich. Nach Absetzen von kamillefarbener Flüssigkeit (ohne feste Bestandteile!) nach 2–2¹/₂ Stunden in die Praxis kommen.

Allgemeines:

- Erforderlich ist ein Überweisungsschein vom Hausarzt / überweisender Arzt.
- Rücksprache bei gerinnungshemmender Medikation erforderlich (Ass, Clopidogrel, Heparin, Marcumar), ebenso bei Herzklappenersatz, Bypassoperation, Koronar-Stent, Herzpass und Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus).
- laufende Medikamente auch am Untersuchungstag weiternehmen.
- nicht mit PKW kommen, sonst keine »Schlafspritze« möglich.
- Untersuchung erfolgt je nach Wunsch mit »Schlafspritze« (Sedierung) oder auch im Wachzustand. Bei Sedierung Zeit zum Ausschlafen einkalkulieren (30–90 Minuten, nicht mit eigenem PKW erscheinen).
- Im Bedarfsfall sind zusätzliche Abführmaßnahmen in der Praxis erforderlich, die zu Terminverschiebungen führen können.
- Da die Dauer der Untersuchungen (auch von Patienten vor Ihnen) aus verschiedenen Gründen schwanken kann, sind Wartezeiten manchmal nicht vermeidbar.
- Vor der Untersuchung bleibt noch genügend Zeit, mit dem Arzt oder der Endoskopie-Schwester offene Fragen zu klären.