

Patienteninformation Koloskopie – Version 1 (Termin 8.00 Uhr bis 8.30 Uhr)

Am Vortag der Untersuchung:

Leichtes Frühstück, keine Ballaststoffe (Müsli, Vollkornbrot, Rohkost o. ä.)

Mittags: breiige Kost, z. B. Suppen, Yoghurt etc.

Um 17.00 Uhr: Clensia 2 Beutel A und Clensia 2 Beutel B zusammen in 1 Liter Wasser auflösen und innerhalb von 30–60 Minuten trinken

Um 20.00 Uhr: 2 Tabletten Bisacodyl 5 mg mit Wasser einnehmen.

Um 21.00 Uhr: Clensia 2 Beutel A und Clensia 2 Beutel B zusammen in 1 Liter Wasser auflösen und innerhalb von 30–60 Minuten trinken.

Weitere Flüssigkeitsaufnahme (Wasser, Tee) möglich.

Am Untersuchungstag:

Weitere Flüssigkeitseinnahme (Wasser, Tee) bis 2 Stunden vor der Untersuchung möglich.

Bitte zu Ihrem vereinbarten Termin in die Praxis kommen.

Allgemeines:

- Erforderlich ist ein Überweisungsschein vom Hausarzt / überweisender Arzt.
- Rücksprache bei gerinnungshemmender Medikation erforderlich (Ass, Clopidogrel, Heparin, Marcumar), ebenso bei Herzklappenersatz, Bypassoperation, Koronar-Stent, Herzpass und Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus).
- laufende Medikamente auch am Untersuchungstag weiternehmen.
- nicht mit PKW kommen, sonst keine »Schlafspritze« möglich.
- Untersuchung erfolgt je nach Wunsch mit »Schlafspritze« (Sedierung) oder auch im Wachzustand. Bei Sedierung Zeit zum Ausschlafen einkalkulieren (30–90 Minuten, nicht mit eigenem PKW erscheinen).
- Im Bedarfsfall sind zusätzliche Abführmaßnahmen in der Praxis erforderlich, die zu Terminverschiebungen führen können.
- Da die Dauer der Untersuchungen (auch von Patienten vor Ihnen) aus verschiedenen Gründen schwanken kann, sind Wartezeiten manchmal nicht vermeidbar.
- Vor der Untersuchung bleibt noch genügend Zeit, mit dem Arzt oder der Endoskopie-Schwester offene Fragen zu klären.